

음양곽(Epimedii Herba)

기원 : 삼지구엽초 *Epimedium koreanum* Nakai, 음양곽 (淫羊藿) *Epimedium brevicornum* Maximowicz, 유모음양곽 (柔毛淫羊藿) *Epimedium pubescens* Maximowicz, 무산음양곽 (巫山淫羊藿) *Epimedium wushanense* T. S. Ying 또는 전엽음양곽 (箭葉淫羊藿) *Epimedium sagittatum* Maximowicz (매자나무과 *Berberidaceae*)의 지상부이다. 이 약은 정량할 때 환산한 건조물에 대하여 이카리인 (C33H40O15 : 676.66) 0.3 % 이상을 함유한다.

성상 : 이 약은 지상부로 줄기와 2회3출 복엽으로 되어있다. 줄기는 가늘고 길며 원기둥 모양이고, 길이 20 ~ 30 cm이다. 세로 능선이 있고 자르기 쉽다. 아랫쪽은 가운데가 비어있고, 중상부는 백색의 수가 있으며 바깥쪽은 갈색 또는 황갈색이다. 소엽은 난상 심형이며 길이 4 ~ 9.5 cm, 너비 3 ~ 8.5 cm이다. 선단은 길게 뾰족하고 엽기는 심형이며 양쪽 소엽의 외열편은 내열편보다 크고 잎 가장자리에는 황갈색이고 가시 모양인 거치가 있다. 바깥쪽은 진한 녹색 또는 황록색이며 매끄럽고 광택이 있다. 뒷면은 회록색이고 잎맥은 돌출하며 황갈색의 부드러운 털이 성글게 나있고 가운데 맥상의 털은 비교적 촘촘하다. 잎은 얇고 질은 종이 모양이다. 음양곽(淫羊藿) 2회3출 복엽이고 삼지구엽초와 비슷하나 잎이 가죽질에 가까운 것이 다르다. 유모음양곽(柔毛淫羊藿) 1회3출 복엽이고 잎의 아래쪽 및 잎자루에는 부드러운 섬모 모양의 털이 뽁뽁하게 덮여 있다. 무산음양곽(巫山淫羊藿) 1회3출 복엽이고 소엽은 피침형 ~ 좁은 피침형이며 길이 9 ~ 23 cm, 너비 1.8 ~ 4.5 cm로 길이가 너비의 5 ~ 6 배이다. 전엽음양곽(箭葉淫羊藿) 1회3출 복엽이고 소엽편은 길이 4 ~ 12 cm, 너비 2.5 ~ 5 cm이며 선단은 점점 뾰족하고 양쪽의 소엽은 아랫쪽이 뚜렷하게 한 쪽으로 치우쳐지고 바깥쪽은 화살 모양이다. 잎의 아래쪽에는 짧은 털이 성글게 나 있거나 털이 없고 잎은 가죽질이다. 이 약은 특유한 냄새가 약간 있고 맛은 약간 쓰다.

성분 : Flavonoid glycoside(icariin, icariside), Flavonoid(desmethylicariin), Lignan(olivil), Alkaloid(magnoflorine)

약리 작용 및 용도 : 혈압강하작용, 성기능흥분작용, 간세포보호작용, 항종양작용, 면역증강작용 / 강정, 강심, 이뇨, 신경성 강장제로 갱년기 고혈압, 소아마비초기, 발기부전, 요슬연약, 반신불수, 류마티스 등에 쓴다.

처방: 찬육단, 이선탕, 장양단, 선령비산

