

자형피 (Cercis chinensis Bunge)

기원 : 콩과 식물인 구슬꽃나무 *Cercis chinensis* Bunge의 줄기껍질을 말린 것이다.

성상 : 낙엽관목이며 높이가 3~5m이고 소지는 지름 3~4cm이며 피목이 많고 골속은 4각형 비슷하며 백색이지만 점차 연한 갈색으로 변하고 수관(髓冠)은 녹색이며 목재는 연한 녹색입니다. 잎은 호생하며 단엽이고 혁질(革質)이며 심장형이고 지름 6~11cm로서 표면은 윤채가 있으며 털이 없고 기부에서 5출맥(5出脈)이 발달하며 뒷면은 황록색으로 엽액 기부에 잔털이 있고 엽병은 길이 3cm정도로서 표면은 자적색(紫赤色) 뒷면은 황록색입니다. 꽃이 너무나 강열하기에 잎은 상대적으로 수수해 보입니다. 4월에 꽃이 피고 꽃은 잎보다 먼저 피며 꽃색깔은 자홍색이며 잎보다 먼저 피고 길이 1.2~1.8cm이며 화경이 없고 7~8개 많은 것은 20~30개씩 모여 달리며 소화경이고 길이 6~15mm로서 꽃받침과 더불어 적갈색이고 털이 없으며 3분의2정도 되는 곳에 마디가 있어 부러집니다. 기판은 길이 8~10mm이고 용골관의 너비 5mm이며 수술은 연한 홍색이고 길이 10~12mm이며 암술은 길이 10mm로서 황록색이지만 끝은 적색입니다. 8~9월에 열매가 성숙되고 핵과는 길이 7~12cm이며 종자는 편형하고 타원형이며 길이 7~8mm로서 황록색입니다. 열매는 화려한 꽃과 너무 다른 모습이 눈에 두드러져 보입니다.

성분 : Tannin, 유기산

약미 & 약성 : 맛은 쓰고 성질은 평하다.

약리 작용 및 용도 : 혈액 순환을 촉진하고 월경을 순조롭게 하며 부기를 가라앉히고 해독한다. 약리 실험에서 포도상 구균에 대한 항균 작용, 항바이러스 작용이 밝혀졌다. 무월경, 기혈이 막혀서 아픈 데, 풍한습비(風寒濕痺), 후비(喉痺), 임증(淋證), 부스럼, 버짐, 옴, 타박상, 뱀에 물린 상처 등에 쓴다. 하루 6~12g을 탕제 · 주제(酒劑) · 환제 · 산제 형태로 만들어 먹는다. 외용약으로 쓸 때는 가루 내어 바른다.

